


| | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|
|  | NOMBRE PRUEBA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO | | CÓDIGO 13-FT-015 |
| | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO APOYO | VERSIÓN 004 |

CARGO: PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARTOS

NOMBRE: _____ **CÉDULA:** _____ **FECHA:** _____

1. SEGURIDAD DE PACIENTE:

1.1. Mencione los cinco momentos del lavado de manos

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____

1.2 Mencione dos mecanismos que usted utiliza para evitar caídas en los pacientes

- (1) _____
- (2) _____

2.

Mencione 4 pautas que hacen parte del parto humanizado

- _____
- _____
- _____
- _____

3. No hace parte del kit de emergencia obstétrica:

- A. vitamina k.
- B. oxitocina
- C. misoprostol
- D. labetalol

4. Cual de los siguientes procedimientos no se realiza de inmediato al nacimiento del recién nacido


- A. SUMINISTRO DE OXITOCINA A LA MADRE
- B. TOMA DE TALLA Y PESO AL RECIEN NACIDO.
- C. SECAR Y ESTIMULAR AL RECIEN NACIDO
- D. LIMPIEZA DE VIAS AEREAS AL RECIEN NACIDO

5. Al momento de activar código rojo se debe garantizar todo lo siguiente excepto

- A. TOMA SERIADA DE SIGNOS VITALES
- B. COMPRESION EXTRINSECA DE LA AORTA ABDOMINAL
- C. 2 ACCESOS VENOSOS PERMEABLES CALIBRE # 20 Ó. #22
- D. SUMINISTRO DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS TIBIOS

6. RN a término de 2300 gr de peso cual es la dosis de vitamina k (fitomenadiona) que debe recibir.

- A. 2MG.
- B. 0.5 MG
- C. 1 MG
- D. NO SE DEBE SUMINISTRAR

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------|
|  | NOMBRE | | CÓDIGO |
| | PRUEBA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO | | 13-FT-015 |
| | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO APOYO | VERSIÓN 004 |

7. Cuáles son las 2 presentaciones de la vitamina k:
 - A. AMP DE 2 MG/ML Y DE 10 MG/2ML
 - B. AMP DE 2 MG/0.2ML Y DE 10 MG/ML.
 - C. AMP DE 0.2 MG/ML Y DE 1 MG/1ML
 - D. AMP DE 1 MG/ML Y DE 10MG/5ML

8. A partir de cuanto se considera en una gestante con más de 20 semanas crisis hipertensiva:
 - A. 155/95 mm/hg
 - B. 140/90 mm/hg
 - C. 150/100 mm/hg
 - D. 160/110. mm/hg

9. HACE PARTE DE MANIOBARAS DE REANIMACION IN UTERO EXCEPTO:
 - A. OXIGENO POR CANULA NASAL SI SATURACION MENOR DE 95%
 - B. BOLO DE LEV
 - C. DECUBITO LATERAL IZQUIERDO
 - D. NIFEDIPINO 30 MG CADA 20 MIN EN LA PRIMERA HORA.

10. Cuál es el peso mínimo que debe tener el recién nacido para poder suministrar vacuna contra hepatitis b
 - A. 1500 gr
 - B. 2500 gr
 - C. 2000 gr
 - D. 1000 gr

11. Cuál es el periodo de tiempo que se recomienda de contacto piel a piel como parte del parto humanizado: _____
12. Idealmente cuanto tiempo debe esperar para suministro de vacuna contra la hepatitis B:

13. _____