

Consideraciones especiales con cada esquema

El medicamento que usted va a recibir es:

Doxorrubicina/ Ciclofosfamida (AC)

- La doxorrubicina se administra de forma IV durante aproximadamente media hora.
- Es roja y puede orinar color anaranjado o rojizo durante 1 o 2 días después de la infusión.
- Puede haber cambios en la coloración de las uñas.
- Generalmente ocasiona diarrea y /o dolor abdominal, preste atención al cambio en las deposiciones, identifique los alimentos que la empeoran, aumente la ingesta de líquidos, no ingiera alimentos ricos en fibra, ni lácteos.
- Avise a su médico si presenta palpitaciones, taquicardia, dificultad respiratoria que empeora con la movilización, hinchazón en las extremidades, fatiga o algo que preocupe.
- La ciclofosfamida por lo general se administra a través de una vena mediante inyección o infusión intravenosa, IV o por vía oral en forma de tableta (esta última no está disponible en Colombia).
- Puede ocasionar orina con sangre, debe prevenirla aumentando la hidratación, su equipo oncológico puede adicionar otro medicamento llamado mesna que contrarresta esta toxicidad.
- Estos medicamentos pueden afectar el aparato reproductor al provocar irregularidad en el ciclo menstrual o la producción de espermatozoides, de manera temporal o permanente. Las mujeres pueden experimentar efectos menopáusicos como sofocos y sequedad vaginal, los cuales pueden mejorar con lubricantes. Además, el deseo sexual puede disminuir durante el tratamiento.
- El cabello va a caerse aproximadamente en 15 días posterior a la aplicación del tratamiento.
- Puede experimentar Náuseas y vómito, por lo que debe consumir alimentos fríos, paletas, consumir galletas de soda y otras recomendaciones suministradas por el equipo de quimioterapia.