

Consideraciones especiales con cada esquema

El medicamento que usted va a recibir es:

Oxaliplatino- capecitabina

- Se administra por vía intravenosa.
- Puede causar estreñimiento en ese caso consuma productos ricos en fibra como la avena y aumente la ingesta de líquidos.
- Mientras recibe tratamiento con Oxaliplatino evite las temperaturas y los objetos fríos.
- Cúbrase la piel, la boca y la nariz si debe salir al aire libre en temperaturas frías.
- No consuma bebidas frías ni use cubitos de hielo en las bebidas.
- Algunas personas pueden tener problemas nerviosos como ardor, entumecimiento u hormigueo, informe a su equipo médico de manera pronta si presenta problemas para caminar, hablar, tragar o decir palabras.
- Llame al médico de inmediato si presenta signos de confusión, disminución del nivel de alerta, cambios en la vista, pérdida de visión, convulsiones o dolor de cabeza muy fuerte.
- Llame a su médico de inmediato si presenta signos de problemas en los pulmones, como falta de aire u otro problema para respirar, aparición o agravamiento de la tos o fiebre.
- Informe a la enfermera si tiene enrojecimiento, ardor, dolor, inflamación, ampollas, llagas en la piel o pérdida de líquido en el sitio donde se colocó el medicamento.
- Este medicamento puede causar una frecuencia cardíaca que no es normal (un intervalo de QT largo en un ECG, torsades de pointes). A veces, esto puede suceder en personas que no tienen riesgo de desarrollar estos problemas de salud. Consulte con su médico.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad. Los problemas de fertilidad pueden derivar en incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre de un niño.