

Consideraciones especiales con cada esquema

El medicamento que usted va a recibir es:

Acetato de goserelina - Acetato de leuprolide - Degarelix

- Inyección debajo de la piel (subcutánea).
- Por medio de inyección mensual, cada 3 meses o cada 6 meses.
- Su médico determinará su dosis y calendario de administración del fármaco.
- Puede presentar sofocos, si son intolerables informe a su médico de esta molestia.
- Las recomendaciones no médicas incluyen:
 - Mantengase bien hidratado con mínimo ocho vasos de agua al día.
 - Beba agua helada o aplique una bolsa de hielo al inicio de un sofoco.
 - Use algodón o telas livianas que permitan una buena ventilación. Vístase con varias capas para desabrigarse según sea necesario.
 - Haga ejercicio regularmente.
 - Trate de practicar meditación o ejercicios de relajación para manejar el estrés, que puede ser un desencadenante.
- Evite los factores desencadenantes como las habitaciones calientes, los alimentos picantes, las bebidas con cafeína y el alcohol.
- Si esta terapia es administrada durante períodos prolongados de tiempo corre el riesgo de causar fragilidad de los huesos (osteoporosis). Se le puede aconsejar que tome suplementos de calcio y vitamina D para ayudar a prevenir la osteopenia. El ejercicio con pesas y una dieta saludable rica en calcio y vitamina D también pueden ayudar a proteger la salud de sus huesos. Le serán formulados también medicamentos que ayudarán a disminuir la pérdida ósea.
- Este medicamento puede afectar el aparato reproductor al provocar una producción irregular o detención permanente de los espermatozoides.
- Además, puede experimentar disfunción eréctil o una disminución del deseo sexual durante el tratamiento.
- La sequedad vaginal y el dolor al mantener relaciones sexuales es uno de los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento contra el cáncer en las mujeres. Los lubricantes y humectantes vaginales (las formas más duraderas de humectantes) pueden ayudar.