

PROCESO ASISTENCIAL	CODIGO: AS-IMG-IN-015
SUBPROCESO IMAGENOLÓGÍA	VERSIÓN: 9
PREPARACION DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL	ACTUALIZACIÓN: 01-03-2017

Señor usuario se le realizará una **Biopsia de Próstata Transrectal**.

Nombre: _____

Fecha: _____ Hora: _____

POR FAVOR INFORME E INDIQUENOS PREVIAMENTE AL DESARROLLO DE ESTA PREPARACION SI USTED TIENE MEDICAMENTOS CON ANTICOAGULANTES (Por ejemplo: Ribaroxava, Clexane, Fragmin, Aspirina, ASA, Warfarina, Heparina)

Comprar:

1. Una (1) Ampolla de **Gentamicina** de 160 mg. **NOTA:** Señor usuario, si usted tiene problemas renales o del oído **ABSTENGASE DE COMPRAR ESTE MEDICAMENTO**, en lugar de él compre una (1) ampolla de **Ceftriazona** por 1 mg. **En ningún caso se administran los dos medicamentos solo uno de ellos.**
2. Seis (6) tabletas de Ciprofloxacina 500 mg
3. Un (1) Travad Enema por 133 ml

Preparación Diez Días antes del examen:

1. No consumir ningún medicamento que contenga (ácido acetyl – salicílico) como el Alka Seltzer, Mejoral, Desenfriol, Aspirineta para niños. Asawin, Dristan, ni ningún medicamento para la gripe. Ni anticoagulantes como Heparina o Warfarina.
2. Si por algún motivo no asistirá a su cita recuerde cancelarla oportunamente.

Día antes del Examen

1. A las 8:00 pm después de la última comida la cual debe ser liviana (caldo, aguadepanela, gelatina, galletas, aromática), tomarse la primera pasta de Ciprofloxacina
2. A las 9:00 pm colocarse el lavado rectal (Travad Enema).

Día del Examen

1. El día del examen debe desayunar a las 8:00 am una aromática o aguadepanela con dos galletas, tomarse la segunda pasta de *Ciprofloxacina* y no comer nada más hasta después de que se realice el examen.
2. **Gentamicina:** Si compro este medicamento. Aplíquese dos (2) horas antes del examen una ampolla de Gentamicina de 160 mg vía intramuscular.

Ceftriazona: Si compro este medicamento. Aplicarse dos (2) hora antes del examen una ampolla de Ceftriazona por 1 mg vía intramuscular.

Recuerde que en ningún caso se deben aplicar las dos ampollas, solo se administra una de las dos según las recomendaciones antes descritas.

3. Continuar tomando la *Ciprofloxacina* cada 12 horas hasta terminar, es decir 8:00 am y 8:00 pm.

Nota: Venir con acompañante y traer orden de patología

Si después de leer estas instrucciones tiene alguna inquietud al respecto por favor consúltelo con alguien de su familia. Si persiste la duda comuníquese con nosotros, con gusto le será resuelta.